ABCÈS MIGRATEUR DE CHOMPRET-L'HIRONDEL

Mickael Samama, Alice Guyon, Stéphane Millez, Sophie Myriam Dridi, Frederick Gaultier

Unité de chirurgie orale, service odontologie, CHU Mondor-Chenevier, 51 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil, France

mickaelsamama@yahoo.com

FIGURES 1 ET 2 **Tuméfaction jugale basse.**

CE JEUNE HOMME DE 31 ANS, fumeur, a consulté aux urgences d'odontologie pour une tuméfaction génienne basse gauche douloureuse évoluant depuis 15 jours. L'anamnèse révélait un antécédent de cellulite d'origine dentaire un an auparavant. L'examen clinique exobuccal (fig. 1 et 2) montrait une masse jugale gauche de 5 cm de plus grand axe d'aspect inflammatoire. Sur le versant endobuccal, il n'y avait ni trismus ni comblement vestibulaire au niveau du secteur 3. Le panoramique dentaire (fig. 3) a montré la présence d'images apicales au niveau des racines de 15, 16, 37 et 46. Il s'agissait donc d'une cellulite dentaire récidivante avec trajet de fistulisation cutanée longeant l'insertion mandibulaire du muscle buccinateur, appelée abcès migrateur de Chompret-L'Hirondel.

La cellulite dentaire[1] est une complication infectieuse aiguë ou subaiguë due à la mortification de la pulpe dentaire ou aux infections parodontales avec pour principale conséquence la formation de pus au niveau des tissus mous de la face et du cou. Les germes proviennent de la flore endogène et la contamination est souvent polymicrobienne. Les complications sont potentiellement mortelles avec le risque de compression des voies aériennes supérieures. L'abcès migrateur de Chompret-L'Hirondel correspond à une collection purulente s'installant progressivement en avant du muscle buccinateur avec une fistulisation cutanée ayant pour point de départ, en règle générale, la dent de sagesse mandibulaire. Le traitement consiste à réaliser l'avulsion de la dent causale, le drainage de la collection et à mettre en place une bi-antibiothérapie associant l'amoxicilline et le métronidazole.

1. **Peron JM, Mangez JF.** Cellulites et fistules d'origine dentaire. Encycl Med Chir Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS, Paris. Tout droit réservé. Stomatologie/odontologie, 22-033-A-10,2002, 14 p.

Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêts.



FIGURE 3 **Panoramique dentaire.** Présence d'une image apicale au niveau des racines de 37, signant la porte d'entrée de la cellulite (flèche).

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN